

GraspXtra™ 21 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - SULFONAMIDA, PIRIDINA PENOXSULAM, TRICLOPYR

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

Composición química:

	p/v
Penoxsulam: 3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo [1,5-c]pyrimidin-2-yl)- α,α,α -trifluorotoluene-2-sulfonamide	3.00 %
Triclopyr: 3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetic acid.....	17.92 %
Ingredientes inertes	79.08 %
Total.....	100.00 %

Contiene: 210 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE.

DENSIDAD: 1,61 a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



FORMULADO POR:

Para Centroamérica y Rep. Dominicana:

Dow AgroSciences LLC

9330 Zionsville Road. Indianapolis, IN 46268-1054 EE.UU.

Para Rep. Dominicana:

Dow AgroSciences de Colombia, S.A.

A.A. 2888, Mamonal, Cartagena, Colombia. Tel. 575 668-8000A

® TM Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

GraspXtra™ 21 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - SULFONAMIDA, PIRIDINA PENOXSULAM, TRICLOPYR

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

GraspXtra™ 21 SC es un herbicida de post-emergencia para el control selectivo de hierba susceptible, de hoja ancha y malezas ciperáceas anuales en arroz.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado.

GraspXtra™ 21 SC debe ser aplicado con boquillas tipo abanico plano Teejet 8002, presión de 35 PSI y un volumen de aplicación de 160 lts de agua /ha.

GraspXtra™ 21 SC puede ser aplicada con equipos terrestres o aéreos. En aplicaciones aéreas se debe conservar la franja de seguridad a los cultivos susceptibles (soya, algodón, girasol, maní, ajonjolí, algunos frutales y hortalizas). Para Rep. Dominicana solo aplicación terrestre empleando boquilla abanico plano 8002 o 8003.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene hasta la mitad con agua el tanque del equipo de aplicación, agregue la dosis completa de **GraspXtra™ 21 SC**, agite bien la mezcla. Rellene con agua el tanque y vuelva a agitar.





Dow AgroSciences

GraspXtra™ 21 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - SULFONAMIDA, PIRIDINA PENOXSULAM, TRICLOPYR

RECOMENDACIONES DE USO:

Para Panamá.

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA	RECOMENDACIONES
ARROZ <i>Oryza sativa</i>	Cotoncillo <i>Eclipta alba</i> Zontol <i>Cyperus iria</i> Clavito <i>Ludwigia linifolia</i>	1 L/ha	Aplicar GraspXtra™ 21 SC cuando las malezas presenten entre 2 y 3 hojas verdaderas. Al momento de realizar la aplicación el suelo debe estar con buenas condiciones de humedad, a capacidad de campo, pero sin charcos.

Para Rep. Dominicana.

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS RECOMENDADA	RECOMENDACIONES
ARROZ <i>Oryza sativa</i>	Arrocillo <i>Echinochloa colonum</i> ; <i>Echinochloa crus-galli</i> Junco <i>Cyperus iria</i> Tresfilon <i>Cyperus ferax</i> Coquillo <i>Cyperus esculentum</i> Aeschynomene rudis <i>Aeschynomene rudis</i>	1.0 - 1.25 L/ha	Aplicar GraspXtra™ 21 SC cuando las malezas presenten entre 2 y 3 hojas verdaderas. Al momento de realizar la aplicación el suelo debe estar con buenas condiciones de humedad, a capacidad de campo, pero sin charcos. El arroz es tolerante a las aplicaciones de GraspXtra™ 21 SC cuando presentan entre 2 y 3 hojas a 1/2" de la elongación de los entrenudos (antes del inicio del primordio floral). En algunas condiciones las aplicaciones pueden resultar en daños temporales al cultivo del arroz que aparecen como necrosis en las hojas y el arroz normalmente se recupera de estos síntomas.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Una sola aplicación por ciclo, en post-emergencia temprana a las malezas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Para arroz 60 días.



Dow AgroSciences

GraspXtra™ 21 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - SULFONAMIDA, PIRIDINA PENOXSULAM, TRICLOPYR

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

6 horas o hasta que haya secado bien el caldo de aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico al cultivo del arroz si se siguen las instrucciones de la etiqueta. Se recomienda agregar coadyuvante para mejorar la calidad de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Evitar el contacto con materiales oxidantes.



GraspXtra™ 21 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - SULFONAMIDA, PIRIDINA PENOXSULAM, TRICLOPYR

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Almacénese en un lugar fresco, seco y alejado del calor. Manténgalo en su envase original, debidamente cerrado con su panfleto, y procurando que su etiqueta se encuentre bien adherida.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO O APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede producir una irritación moderada en los ojos y una lesión moderada en la córnea. Un breve contacto puede causar una ligera irritación en la piel con enrojecimiento local. No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque una absorción en cantidades perjudiciales. La toxicidad por ingestión es baja. La ingesta accidental de pequeñas cantidades durante las operaciones normales de mantenimiento no debería causar lesiones.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dar a la persona a beber un vaso de agua a sorbos si es capaz de ingerir. No inducir al vómito a menos que se recomiende por el Instituto de Toxicología o por el médico. Nunca administrar nada por vía oral a un paciente inconsciente.

Para Rep. Dominicana: Suministre tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y agua abundante durante 15-20 minutos.

POR INHALACIÓN: Traslade la víctima al aire libre. Si la persona no respira, llame a un centro de emergencia o pida una ambulancia, provea respiración artificial; si es de boca a boca use un protector (máscara de bolsillo, etc)..

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Si hay lentes de contacto, quitarlas después de los primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica.	(502) 2230-0807
	Centro de Intoxicaciones.	(502) 2232-0735
Belize	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
		(505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan)	(809) 684-3478/3672
	Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 681-7828

GraspXtra™ 21 SC

Etiqueta Web - Centroamérica

HERBICIDA - SULFONAMIDA, PIRIDINA PENOXSULAM, TRICLOPYR

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**CONSULTE AL PROFESIONAL
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES
O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA		
EL SALVADOR		
HONDURAS		
COSTA RICA		
PANAMÁ	6833	15-07-2014
REP. DOMINICANA	4266	26-08-2013