

# Propiconazole<sup>TM</sup> 25 EC

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOLE PROPICONAZOLE

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS**

**Composición química:**

	% p/v
(2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole .....	25,00 %
Ingredientes inertes .....	75,00 %
Disolvente: Solvesso	
Total .....	100,00 %

**Contiene:** 250 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

## PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE.

**DISOLVENTE:** Solvesso

**DENSIDAD:** 0,993 mg/kg a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.  
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



**FABRICADO Y FORMULADO POR:**

Dow AgroSciences de Colombia, S.A.

A. A. 2888, Mamonal, Cartagena, Colombia. Teléfono: (575) 668 - 8000

® <sup>TM</sup> Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow

# Propiconazole™ 25 EC

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOLE PROPICONAZOLE

## USO AGRONÓMICO

### MODO DE ACCIÓN:

**Propiconazole™ 25 EC** es un fungicida sistémico de acción protectora y curativa. Se absorbe vía foliar con traslocación acropetal. Actúa por inhibición de la biosíntesis del ergosterol (C) (DMI).

### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Revise que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado.

Utilice boquillas de cono hueco.

Con equipo terrestre utilice 400 litros de caldo por hectárea.

En aplicaciones aéreas utilizar con aceite agrícola (5-10 litros/hectárea) y agua (15-30 litros/hectárea).

El producto no tiene acción corrosiva sobre el equipo de aplicación.



### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

**EN ACEITE:** Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de aceite, luego vierta la cantidad de **Propiconazole™ 25 EC** recomendada, termine de llenar con aceite y agite bien durante 5 minutos.

**EMULSIÓN EN AGUA Y ACEITE:** Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de aceite, vierta la cantidad recomendada de **Propiconazole™ 25 EC** y emulsificante, luego agitar bien durante 5 minutos, luego terminar de llenar el tanque con agua y agitar bien durante 15 minutos.

**EN AGUA:** Llene el tanque hasta la mitad de mezcla, agregue la dosis recomendada de **Propiconazole™ 25 EC**, agite y luego termine de llenar con agua.

Se recomienda aplicar **Propiconazole™ 25 EC + Dithane™ 60 SC**, para reducir los riesgos de resistencia.





Dow AgroSciences

# Propiconazole™ 25 EC

Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOLE PROPICONAZOLE

## RECOMENDACIONES DE USO:

Usos aprobados en Guatemala, Honduras y Panamá.

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADA	RECOMENDACIONES
Banano y Plátano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka amarilla, <i>Mycosphaerella musicola</i> . Sigatoka negra, <i>Mycosphaerella fijiensis</i> . Cordana, <i>Cordana musae</i> . Cladosporium, <i>Cladosporium masarum</i> .	400 mL/ha (280 mL/mz)	Aplicar durante el período de lluvia, realizando un máximo de 8-10 aplicaciones en dicho período. Rotar con productos de diferente modo de acción, como estrategia antiresistencia.

## INTERVALO DE APLICACIÓN:

En banano cada 8 días.

## INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Para banano no hay restricción.

## INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espere a que el rocío de la aplicación haya secado, o en caso contrario utilizar el equipo de protección personal completo.

## FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis recomendadas en el panfleto.

## COMPATIBILIDAD:

**Propiconazole™ 25 EC** es perfectamente miscible en aguas y aceites agrícolas. Compatible con los fungicidas e insecticidas usados en bananos y plátanos.

# Propiconazole<sup>TM</sup> 25 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOLE PROPICONAZOLE

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No almacene este producto en casas de habitación. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénelo bajo llave en un lugar seco, ventilado. No lo transporte ni lo almacene junto con alimentos, medicinas, ni con utensilios de uso personal. Manténgase el producto cerrado, bien etiquetado y en su envase original. Es inflamable y a altas temperaturas es explosivo.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO O APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



#### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Se presenta enrojecimiento de los ojos y alergias en la piel.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** No provoque el vómito ya que puede inducir a una aspiración pulmonar. Dé a beber bastante agua para diluir el producto.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

**POR INHALACIÓN:** Retire el paciente a un lugar ventilado y seco. Afloje la ropa contaminada y vigile la respiración.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lave inmediatamente con suficiente agua limpia durante 15 minutos.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

### TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

### CENTROS INTERNACIONALES DE INTOXICACIÓN

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información Toxicológica. Centro de Intoxicaciones.	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
Belice	Unidad de Epidemiología.	(501) 223-1639
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 1294 (505) 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones.	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos.	(507) 523-4948 (507) 523-4968
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-7828

# Propiconazole™ 25 EC

## Etiqueta Web - Centroamérica

FUNGICIDA - TRIAZOLE PROPICONAZOLE

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**CONSULTE AL PROFESIONAL  
EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, ANTES DE  
COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS  
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS  
RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.**

**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.**



**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES  
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES  
O EMPAQUES VACÍOS.**

### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES  
EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE  
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO  
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

### AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé o sea diferente al estipulado en este panfleto y en la etiqueta.

PAÍS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	479-75	10-08-1999
BELICE		
EL SALVADOR		
COSTA RICA		
PANAMÁ	7482	08-10-2015
REP. DOMINICANA		