



Aproach Prima™ 28 SC

FUNGICIDA

DESCUBRA LA INNOVACIÓN

Si la enfermedad se aproxima,
prevéngala con **Aproach Prima™ 28 SC**.

¿Qué es Approach Prima™ 28 SC ?


- **Approach Prima™ 28 SC** es un fungicida de amplio espectro para el control foliar de enfermedades con acción preventiva, curativa y sistémica.
- **Approach Prima™ 28 SC** se debe aplicar dentro de un programa de protección de cultivo en rotación con otros fungicidas.
- **Approach Prima™ 28 SC** penetra rápidamente en la planta, reduciendo pérdidas de lavado por lluvias a partir de una hora después de realizada la aplicación.

CARACTERÍSTICAS


- **Approach Prima™ 28 SC** se absorbe rápidamente después de la aplicación.
- Tiempo estimado: menos de 2 horas.
- Rápida movilización en el sistema vascular de la planta de café.
- Hasta un 40% penetra en el interior de los tejidos.
- Formulación con resistencia al lavado por lluvia.

CARACTERÍSTICAS BIOCINÉTICAS ÚNICAS


- Difusión a través de la capa cerosa foliar.
- Sistemicidad superior y excelente movimiento translaminar.
- Mejor distribución y penetración en la planta.
- Metabólicamente estable dentro de la planta.



Distribución por la capa cerosa



Acción sistémica via Xilema y translaminar



Redistribución dentro de la hoja

RECOMENDACIONES DE USO

El producto **Approach Prima™ 28 SC** está recomendado para uso en Panamá.

Cultivo	Plaga	Dosis mL/ha o mL/mz	Modo de aplicación
Café (40)*	Roya del Cafeto (<i>Hemileia vastatrix</i>)	400-500 mL/ha (280-350 mL/mz)	No realice más de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo. Realice la primera aplicación de forma preventiva durante la fase de germinación, usando intervalos de 60 días para las siguientes aplicaciones. Use la dosis mayor en áreas donde exista mayor presencia de la enfermedad. Use un adyuvante a base de aceite mineral al 0.5% v/v.
	Mancha de Hierro (<i>Cercospora coffeicola</i>)	500-350 mL/ha	No realice más de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo. Realice la primera aplicación de forma preventiva durante la fase de germinación, usando intervalos de 60 días para las siguientes aplicaciones. Use un adyuvante a base de aceite mineral al 0.5% v/v.
Arroz (42)*	Tizón de la hoja (<i>Pyricularia oryzae</i>)	500 mL/ha	Para el control de tizón de la hoja realice una aplicación de forma preventiva, repita de ser necesario a un intervalo no menor a 14 días, no realice más de dos aplicaciones por ciclo de cultivo.

*() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Distribuido por:



Conoce más de nuestro programa en: www.reddecustodia.com



Razón Social de la Compañía: Corteva Agriscience Costa Rica S.A. / Approach Prima™ 28 SC - Registro: 6788 - Categoría Toxicológica III - Franja: Azul.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA. Tel.: (507) 523 - 4948 / (507) 523 - 4968