

Divixton™

Neo 2,5 EC

Rinskor™ active

HERBICIDA

Actúa diferente y se ve diferente

Al inicio algunas malezas se observan aún verdes (sin quemado), pero tienen un daño irreversible en los puntos de crecimiento.

Gramíneas



Hojas anchas



Ciperáceas



Aplicando **Divixton™** Neo 2,5 EC

invierta en su tranquilidad, realizando un control de malezas oportuno, efectivo y de amplio espectro

Divixton™ Neo 2,5 EC



NO TRATADO



Divixton™

Neo 2,5 EC

Rinskor™ active

HERBICIDA



Divixton™

Tecnología en su cultivo


RED DE CUSTODIA www.reddecustodia.com Distribuido por:



Divixton™ Neo 2,5 EC, es un novedoso herbicida sistémico, para aplicaciones de post-emergencia temprana. Siendo selectivo al cultivo de arroz, controla un amplio espectro de malezas gramíneas, ciperáceas y hojas anchas de importancia económica.

PROPIEDADES

Nombre Comercial	Divixton™ Neo 2,5 EC
Ingrediente activo	Rinskor™ Active
Concentración	25 gramos/Litro
Grupo químico	Auxinas sintéticas
Familia química	Aripicolinatos
Formulación	Neo EC
Presentación	1 Litro



Nueva familia química



Amplio espectro de control

Ciperáceas



(*Cyperus iria*)

Gramíneas



(*Echinochloa*)

Hojas anchas



(*Murdannia nudiflora*)



(*Ludwigia hyssopifolia*)



(*Ipomoea sp.*)

BENEFICIOS

Baja dosis de uso

Litros / Hectárea

1 - 1.2

(25 - 30 g i.a/ha)

= **Bajo impacto ambiental***

*Cuando es usado de acuerdo a las recomendaciones de etiqueta

Selectividad al cultivo:

Selectivo a las variedades convencionales en siembra directa o trasplante

Divixton™ Neo 2,5 EC debe ser el primer post-emergente aplicado al cultivo

País	Malezas	Dosis
Panamá	Arrocillo (<i>Echinochloa</i>)	1 - 1.2 L/ha
	Coyolillo (<i>Cyperus iria</i>)	
	Palo de agua (<i>Ludwigia hyssopifolia</i>)	
	Botón blanco (<i>Hyptis capitata</i>)	
	Tuquito (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)	
	Piñita (<i>Murdannia nudiflora</i>)	
	Batatilla (<i>Ipomoea sp.</i>)	


Momento de aplicación:

Post media - Rescate según necesidad

Divixton™ Neo 2,5 EC

Post - temprana

Quema - pre emergencia




* La eficacia y la selectividad de, **Divixton™ Neo 2,5 EC** no se ve afectada cuando es aplicado con los siguientes herbicidas de acción residual: Clomazone, pendimetalina y diflufenican.

Control efectivo de malezas

con resistencia de sitio activo a otros herbicidas

Formulación Neo EC

de baja volatilidad, sin solventes derivados del petróleo y con coadyuvante incluido



CLAVES DEL ÉXITO CON Divixton™ Neo 2,5 EC

Aplicación oportuna

Sobre malezas en estado inicial de crecimiento

Gramíneas: 3 hasta 4 hojas

Hojas anchas: hasta 15 cm de altura

Ciperáceas: 8 cm de altura

Cultivo con 3 hojas o más, sin raíces expuestas, ni síntomas de estrés.



1 - 1.2

litros/hectárea
(25 - 30 gramos i.a)

Dosis efectiva

Buenas prácticas de manejo de riego y fertilización

(1-3 días después de la aplicación)

Calibración y limpieza del equipo de aplicación y tanque de mezcla